

Garrapatas

Una de las especies de garrapatas más difundidas en las casas es la Garrapata marrón del perro (*Rhipicephalus sanguineus*-Latreille). Por lo general prefieren zonas cálidas y pueden parasitar numerosos animales tales como gatos, conejos, roedores, aves e incluso reptiles, pero se las encuentra predominantemente en los perros; ocasionalmente puede atacar humanos, ocasionando picaduras muy molestas. Además, las garrapatas son transmisoras de agentes patógenos causantes de importantes enfermedades tales como: Leptospirosis (*Leptospira*), babesiosis canina (*Babesia canis*), Hepatozoonosis (*Hepatozoon canis*), fiebre Q (*Coxiella burnetii*). Las garrapatas reducen la vitalidad de los perros y generalmente se vuelven irritables. Los adultos se ubican normalmente en las orejas o entre los dedos de las patas, mientras que las larvas y las ninfas se alojan en el pelaje largo detrás de la nuca del animal.

Donde se encuentran:

Es frecuente hallarlas escondidas en molduras de puertas y ventanas (marcos de puertas y ventanas) y muebles. Las hembras pueden llegar a depositar hasta 4000 huevos o más, en las grietas y resquicios de las cunas de los perros o de los sitios frecuentados por ellos (rincones, paredes, troncos de árboles, malezas, etc.). La duración total del desarrollo es de 6 meses.

Medidas de control:

- a) *Saneamiento (eliminación de escombros, césped bien cortado, etc).*
- b) *Aplicación de garrapaticidas en los lugares infestados.*
- c) *Tratamiento veterinario de los perros.*