

Sanidad ambiental

- TermiXAN BP

Clasificación: Rodenticida raticida.

Formulación: Cebo en bloques parafínicos.

Principio activo: Bromadiolone 0,005 %.

Plagas: rata negra, rata de Noruega, rata alejandrina, laucha o ratón casero, rata gris y ratones de campo.

Generalidades: Es un rodenticida anticoagulante de tipo monodósico. Con una sola ingestión elimina ratas y ratones a partir del segundo día. La muerte se asemeja a la que produce la vejez y de este modo sus congéneres no recelan del alimento.

Presentación: blister x 120 grs. y bolsas x 1 kg.



Recomendaciones de uso:

Modo de empleo: Colocar los bloques donde se observen signos de presencia (excrementos, pisadas, pelos, manchas de grasa) en las cercanías de las cuevas y lugares de tránsito.

Dosis: Ratas: 2-8 bloques a intervalo de 4-9 metros.

Ratones: 1 bloque cada 2-4 metros.

Mantener ininterrumpidamente la cantidad de cebo limpio y fresco hasta que no se evidencien signos de presencia. Se aconseja colocar los bloques dentro de tubos o cajas que permitan el acceso exclusivo a los roedores, ya que así se sienten más seguros al comer escondidos; por otro lado el cebo queda protegido de la intemperie y del acceso a animales domésticos.